

FERADAM



Croisement entre Adams 10 et Chandler

Observations issues des vergers niveau 1 et 2 de la Station de Creysse – mai 2016


Date des principaux stades phénologiques :

	Débour.	Floraison femelle			Floraison mâle		
	Cf	Ff ₁	Ff ₂	Ff ₃	Fm ₁	Fm ₂	Gm
Feradam	02-avr	01-mai	07-mai	14-mai	15-avr	20-avr	26-avr
Lara	07-avr	29-avr	07-mai	13-mai	18-avr	22-avr	29-avr
Franquette	19-avr	06-mai	15-mai	18-mai	27-avr	01-mai	09-mai

L'arbre : vigueur faible, port étalé avec départs de branches à angles ouverts et rameaux trapus

Maladies : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose moyenne à forte sur feuilles et fruits

Production et qualité des noix : maturité du fruit proche de Lara®



	Calibre (% du poids sec)				Cerneaux		
	< 30 mm	> 32 mm	> 34 mm	> 36 mm	Rdt cass.	% Extra	% Déchet
Feradam	1,4 %	95,3 %	88,3 %	71,0 %	45,1 %	66,7 %	8,2 %
Lara	2,1 %	96,2 %	90,1 %	71,5 %	42,6 %	74,6 %	9,8 %
Franquette	14,2 %	53,8 %	11,8 %	0,8 %	43,6 %	82,4 %	3,6 %

Points forts : Très bon calibre, intérêt pour le marché de la noix en coque

Points faibles : Débourrement précoce ; arbre très peu vigoureux et développement faible
Départs de branches à angles ouverts et mise à fruit rapide nécessitant le tuteurage des jeunes plants
Positionnement des noix favorable aux coups de soleil sur fruits
Cerneaux foncés au goût assez fade

