

FERNOR



Croisement entre Franquette et Lara®

Observations issues des vergers de la Station de Creysse – mai 2016


Date des principaux stades phénologiques :

	Débour.	Floraison femelle			Floraison mâle		
	Cf	Ff ₁	Ff ₂	Ff ₃	Fm ₁	Fm ₂	Gm
Fernor	21-avr	06-mai	16-mai	31-mai	28-avr	02-mai	09-mai
Lara	08-avr	29-avr	07-mai	13-mai	18-avr	22-avr	29-avr
Franquette	19-avr	06-mai	15-mai	18-mai	27-avr	01-mai	09-mai

L'arbre : port érigé et vigueur moyenne mais inférieure à Franquette

Maladies : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose moyenne

Production et qualité des noix : maturité du fruit tardive, similaire à Franquette



	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
— Fernor (1990)	0,53	0,84	1,47	2,20	3,79	2,29	3,84	1,91	4,44	4,11	3,37	5,85	5,56	4,24	4,84	3,71	3,84	4,49	2,43	3,99	4,27	3,40
— Lara* (1990)	0,56	2,84	2,85	0,65	4,62	4,24	6,69	3,88	5,23	4,85	5,66	3,07	6,35	3,97	4,51	3,53	4,18	3,28	2,00	3,40	5,30	5,04

* en équivalent noix sèches (sauf pour 2015 car pas vendues en noix fraîches)

	Calibre (% du poids sec)			Cerneaux		
	< 30 mm	> 32 mm	> 34 mm	Rdt cass.	% Extra	% Déchet
Fernor	9,5 %	66,2 %	34,8 %	47,9 %	82,5 %	3,9 %
Lara	1,7 %	95,0 %	83,8 %	43,7 %	85,1 %	4,7 %
Franquette	17,6 %	54,6 %	20,3 %	43,6 %	82,4 %	3,6 %

Points forts : **Débourrement tardif**
Par rapport à Franquette, mise a fruit plus rapide et productivité du verger supérieure
Bonne qualité de la noix et du cerneau

Points faibles : Cultiver de préférence sur des sols riches avec irrigation
Vigueur moyenne impliquant une taille régulière